

INFEKČNÍ ZÁNĚTY TLUSTÉHO STŘEVA

STAFYLOKOKOVÁ ENTEROTOXIKOZA

etiologie- Staphylococcus aureus- jeho enterotoxin (termostabilní)

CLOSTRIDIOVÉ ENTEROTOXIKÓZY

etiologie- Clostridium perfringens typ A- termolabilní enterotoxin
typ C

Clostridium difficile —> klostridiová kolitida-nozokomiální

pomnožení při rozvratu střevní mikroflóry po ATB

průkaz toxinu ve stolici- ELISA, PCR

terapie- lehké formy- metronidazol

těžké formy-metronidazol + vankomycin

komplikace- toxické megakolon

BACILUS CEREUS

KOLIBACILÁRNÍ STŘEVNÍ ZÁNĚTY

INTESTINÁLNÍ FORMA KAMPYLOBAKTERIÓZY (nejčastěji)

zoonotický charakter

nákaza se přenáší mlékem, sýrem, masem

hlavní klinický projev- prujmy

kampylobakter se množí ve žluči- onemocnění muže probíhat jako akutní

cholecstitida nebo i pankreatitida

artritida

kultivace mikroby se stolice či protilátky v seru

symptomatická terapie

při těžkém průběhu makrolidová ATB

SALMONELÓZY (2.nejcastejsi)

SHIGELÓZY

prudký zánět tlustého střeva provázeny tenesmy a četnými, málo obsaznými

vodnatými stolicemi s příměsí hlenu, případně i krve

YERSENIOZY

VIROVÉ-adenoviry, koronaviry, noroviry, rotaviry

NEINFEKČNÍ ZÁNĚTY TLUSTÉHO STŘEVA

PŘI CELKOVÝCH ONEMOCNĚNÍCH

Treitzova kolitida při uremii

kolitidy při imunodeficientních stavech

POSTRADIACNÍ KOLITIDA

po radioterapii pánve- děloha s adnexy, rektum, prostata

POLEKOVÁ KOLITIDA

ATB- penicilin, ampicilin, amoxicilin, clindamycin

CHT

NSA

ISCHEMICKÁ KOLITIDA

DIVERTIKULITIDA