

Gastrointestinální infekce

Postihují především tenké a tlusté STŘEVO, méně často jícen a žaludek

Vyvolávající agens

bakterie- KAMPYLOBAKTER- vyšší konzumace drůbeže- rizikovější chlazená kuřata z malých chovů

krev ve stolici

SALMONELA- zelená stolice, křeče

Yersenia- stolice s krví

vepřové maso, hlavně zabijačce

viry- ROTAVIRY

NOROVIRY- kontaminované vodou, hlavně v zimě

paraziti

Gastroenteritida

zvracení

průjem

bolest břicha

A FEBRILNÍ- ALIMENTÁRNÍ cestou-intoxikace vyvolané bakteriálními toxiny

toxin termoLABILNÍ

spíše PRŮJMY

toxin termoSTABILNÍ

stafylokoková enterotoxikóza

Bacillus cereus

spíše ZVRACENÍ

obtíže trvají obvykle 24 hodin

FEBRILNÍ průběh- rotavirové a adenovirové gastroenteritidy

Hemoragická enteritida

horečka

bolest břicha

tenesmy

krev a hlen ve stolici

SHIGELA

SALMONELA

KAMPYLOBAKTER

YERSINIE

Komplikace- dehydratace s rozvrátit vnitřního prostředí- nejčastěji

Anamnéza

kontakt s nemocným, dietní chyba, cestování

Fyzikální vyšetření

Laboratoř

vyšetření stolice

Terapie-SYMPTOMATICKÁ

rehydratace

dieta-s omezením tuků a mléčných výrobků

adsorbencia- u průjmů vyvolaných toxinem či virové průjmy

aktivní uhlí

Smekta