

Streptokokové a stafylokokové infekce

Streptokokové infekce

streptokoky- G+ koky

normální flóra dutiny ústní a horních cest dýchacích

STREPTOKOKUS PYOGENES

kůže a podkoží- neohraničené hnisavé infekce- FLEGMÓNA, narozdíl od stafylokoků

erysipel

impetigo, celulitis, nekrotizující fascitida

respirační trakt

streptokoková nasofaryngitida

spála-streptokoková angina (streptokok vyplavuje toxin)

streptokoková bronchopneumonie

infekční endokarditida

STREPTOKOKUS PNEUMONIE

pneumonie

zánět mozkových blan

postinfekční komplikace

revmatická horečka

akutní glomerulonefritida

Stafylokokové infekce-nejčastější infekce, většinou lehké

stafylokoky- G+ koky

komenzálové běžně se vyskytující na těle

KOŽNÍ infekce

FOLIKULITIDA= zánět vlasového folikulu nebo mazové žlázy —> epitel vystylající folikul

postupně nekrotizuje a hnisavou kolikvací přechází proces do podkoží- FURUNKL- splýváním furunklů-
KARBUNKL

impetigo

mastitida u kojících žen

často se SPONTÁNNĚ vyhojí, někdy nutné chirurgické ošetření (incize)

OSTEOMYELITIDY

mohou superficiálně nasedat na virové onemocnění- nejčastěji komplikace chřipky

tvorba empyemů a plicních abscesů

toxikózy- onemocnění způsobené stafylokokovými toxiny

TOXICKÝCH ŠOKOVÝCH SYNDROM

ENTEROTOXIKÓZY

STAFYLOKOKUS EPIDERMIDIS

infekční endokarditida, nebo jako nozokomiální infekce

terapie

AKUTNÍ infekce- ATB terapie dle citlivosti- peniciliny, makrolidy

narůstá rezistence

CHRONICKÉ infekce- selhává ATB terapie, i přesto, že jsou původci citliví