

Zoonózy

Infekční onemocnění přenášené ze zvířat na člověka

Často získány NEPŘÍMO

kontaminovaná strava nebo tekutiny

SALMONELÓZA

KAMPYLOBAKTERIÓZA

Toxoplazmóza

Tularémie

inhalací kontaminované prachu či aerosolu- ornitóza

pomocí živého vektoru- KLÍŠTĚ

Lymfská borelióza

klíšťová meningoencefalitida

Projevy často NESPECIFICKÉ

flu-like syndrom

lymfadenopatie- tularemie-centrální kolikvace 1 nebo více postižených uzlin

Yersenióza-zduření mesenterických lymfatických uzlin- připomíná akutní

apendicitidu

listerií- může evokovat infekční mononukleózu

GIT příznaky

aseptické meningoencefalitidy

Diagnostika

anamnéza- kontakt se zvířaty, riziková povolání, přísátí klíštěte

průkaz PCR

LATENCE NÁSTUPU TVORBY PROTILÁTEK- 2-3.týden onemocnění

Terapie

ATB empiricky- volit ta s dobrým IC průnikem

makrolidy

deoxymykoin

flurochinolony

Prevence- zejména u imunokompromitovaných pacientů a těhotných žen

dostatečně tepelně upravovat stravu z živočišných zdrojů (maso, vejce)

důkladně omýt čerstvou zeleninu pod tekoucí vodou

nepoužívat nepasterizované mléko a výrobky z něj

chránit se před klíštětem

vyloučit kontakt domácích zvířat s divoce žijícími